



## NEUMONIA AGUDA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

La neumonía aguda adquirida en la comunidad es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes y son una importante causa de mortalidad y morbilidad.

Los pacientes con esta patología que requieren internación hospitalaria son ancianos y aquellos que padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica provocada por bronquitis crónica y frecuentemente asociada al tabaco. La estadística sobre pacientes tratados ambulatoriamente con esta enfermedad es difícil de obtener. Pero por ejemplo en USA la incidencia de esta neumonía en 1994 fue de 170 casos por 10.000 individuos y en mayores de 65 años de 280 casos en 10.000.

La mortalidad es mayor en ancianos y a toda edad depende del germen causal y las condiciones generales del paciente.

Los gérmenes patógenos bacterianos que causan esta enfermedad son el neumococo (el penicilina sensible y el penicilina resistente), el hemofilus influenza (el ampicilino sensible y el ampicilino resistente) y la moraxela catarralis, antes conocida como neiseria catarralis (todas sus especies resistentes a la penicilina). La causa más común sigue siendo el neumococo. El estafilococo aureus causa la neumonía post gripal, la klebsiela afecta a pacientes con alcoholismo crónico y la pseudomona aeruginosa afecta a pacientes con bronquiectasias y fibrosis quística. La neumonía aspirativa es causada por múltiples gérmenes.

Existen pneumonias consideradas atípicas que se dividen en zoonóticas, como la psitacosis, tularemia y fiebre Q y no zoonóticas, causada por legionelas, mycoplasma y Chlamydia.